

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 21-5-64 297201

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

EDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

CARIEGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.

C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Bulletin n° 44 de MAI 1964

1964-11

- AVERTISSEMENTS -

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - La croissance de la végétation est actuellement très rapide. Les germes hivernants sont encore nombreux alors que des taches peuvent être présentes en plus ou moins grand nombre selon les vergers. En conséquence, les conseils contenus dans le précédent bulletin demeurent valables.

Appliquer un nouveau traitement dès l'annonce de risques de chûtes de pluie.

VIGNE

BLACK-ROT - Les projections de germes hivernants (ascospores) à partir des Périthèces formés dans les grains de raisin attaqués l'année précédente vont se poursuivre au cours des pluies à venir, avec intensité. La croissance du feuillage est actuellement rapide et les jeunes feuilles ne sont pas protégées par le précédent traitement.

Dans les vignes régulièrement attaquées, notamment en 1963, nous conseillons d'appliquer un nouveau traitement. Celui-ci sera d'autant plus efficace qu'il sera placé juste avant les prochaines pluies.

Dans les foyers, les premières taches pourraient apparaître au cours des premiers jours de la semaine prochaine.

- INFORMATIONS -

ARBRES FRUITIERS

ARAIGNEES ROUGES (*Pannonychus Ulmi*) - Alors que, dans les situations chaudes, les éclosions sont à peu près terminées (sur pommier et poirier notamment) elles se poursuivent encore dans les lieux plus frais. Il est conseillé de bien surveiller les vergers, un second traitement pouvant être souvent nécessaire.

ROUILLE DU PRUNIER - Appliquer, avant la prochaine période pluvieuse un produit à base soit de Zinèbe, soit de Zirame.

VIGNE

MILDIOU - Poursuivre méthodiquement la suppression des repousses de la base des souches.

7.7.64 7

ARAIGNEES ROUGES - Dans les vignes où cette espèce existe, les éclosions se poursuivent. Surveiller la face inférieure des feuilles et renouveler le traitement précédemment conseillé si sa persistance d'action s'avère insuffisante.

CULTURES LEGUMIERES

PEIGNE DU POIREAU - Les premiers dégâts sont observés sur poireau et parfois sur ail. On pourrait traiter les cultures avec un Esther phosphorique autorisé en culture maraîchère ou avec du D.D.T. ou du Carbaryl.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Sur les cultures de primeurs, appliquer dès à présent, un premier traitement.

DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE - Les adultes sont nombreux et des pontes ont été déposées. Le traitement sera le plus efficace quand il sera réalisé lorsque les jeunes larves auront atteint la taille d'un grain de blé.

LUZERNE

NEGRIL - De nombreux adultes sont visibles et les premières pontes ont été déposées. Sur les luzernes de deuxième coupe, effectuer un traitement dès que les premières larves commenceront leur dégâts avec du H.C.H., du Lindane ou du D.D.T.

TOULOUSE, le 6 MAI 1964

les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

l'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

L. IMBERT